

レジメン名	抗がん剤(商品名)	用量	用法	1クール
CHOP	エンドキサン	750mg/m ²	点滴静注d1	21日
	ドキシソルビシン	50mg/m ²	点滴静注d1	
	オンコピン	1.4mg/m ²	点滴静注d1	
mini CHOP (weekly)	エンドキサン	350mg/m ²	点滴静注d1	7日
	ドキシソルビシン	20mg/m ²	点滴静注d1	
	オンコピン	1mg/m ²	点滴静注d1	
R-CHOP	リツキサン	375mg/m ²	点滴静注d1	21日
	エンドキサン	750mg/m ²	点滴静注d2(3)	
	ドキシソルビシン	50mg/m ²	点滴静注d2(3)	
	オンコピン	1.4mg/m ²	点滴静注d2(3)	
ABVD	ドキシソルビシン	25mg/m ²	点滴静注d1,15	28日
	ブレオ	10mg/m ²	点滴静注d1,15	
	エクザール	6mg/m ²	点滴静注d1,15	
	ダカルバジン	375mg/m ²	点滴静注d1,15	
ABVd	ドキシソルビシン	25mg/m ²	点滴静注d1,15	28日
	ブレオ	10mg/m ²	点滴静注d1,15	
	エクザール	6mg/m ²	点滴静注d1,15	
	ダカルバジン	250mg/m ²	点滴静注d1,15	
A+AVD	ドキシソルビシン	25mg/m ²	点滴静注d1,15	28日
	エクザール	6mg/m ²	点滴静注d1,15	
	ダカルバジン	375mg/m ²	点滴静注d1,15	
	アドセトリス	1.2mg/kg	点滴静注d1,15	
A+AVd	ドキシソルビシン	25mg/m ²	点滴静注d1,15	28日
	エクザール	6mg/m ²	点滴静注d1,15	
	ダカルバジン	250mg/m ²	点滴静注d1,15	
	アドセトリス	1.2mg/kg	点滴静注d1,15	
リツキサン 単独	リツキサン	375mg/m ²	点滴静注d1	7日
ニボルマブ	オプジーボ	240mg/body	点滴静注d1	14日
オビヌツズマブ	ガザイバ	1000mg/body	点滴静注d1	2ヶ月
MCNU	サイメリン	90mg/m ²	点滴静注d1	2~3ヶ月に1回
トレアキシシン	トレアキシシン	120mg/m ²	点滴静注d1,2	21日
アドセトリス	アドセトリス	1.8mg/kg	点滴静注d1	21日
オフアツムマブ	アーゼラ	2000mg/body (初回のみ 300mg/body)	点滴静注週1回、8回投与 9~12回は4週間1回	
GEM	ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注d1,8,15	28日

レジメン名	抗がん剤(商品名)	用量	用法	1クール	
GEM+CDDP+DEX	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注d1,8	21日	
	シスプラチン	75mg/m ²	点滴静注d1		
	デキサメタゾン	40mg/body	点滴静注d1~4		
VCR (Ph+ALL維持療法)	オンコビン	1.3mg/m ²	点滴静注d1	28日	
	プレドニン	60mg/m ²	経口投与d1~5		
	グリベック	600mg/m ²	経口投与d1~28		
	(スプリセル)	100mg/m ²	経口投与d1~28		
VCR (ALL維持療法)	オンコビン	1.3mg/m ²	点滴静注d1	28日	
	プレドニン	60mg/m ²	経口投与d1~5		
	メソトレキセート	20mg/m ²	経口投与d1,8,15,22		
	ロイケリン	60mg/m ²	経口投与d1~28		
ロイスタチン	ロイスタチン	0.09mg/kg	点滴静注d1	28日	
多発性 骨髄腫	ベルケイド 皮下注	ベルケイド	1.3mg/m ²	皮下注d1,4,8,11	21日
	ベルケイド 静注	ベルケイド	1.3mg/m ²	点滴静注d1,4,8,11	21日
	ベルケイド 皮下注 維持療法	ベルケイド	1.3mg/m ²	皮下注d1,8,15,22	35日
VCD	ベルケイド	1.3mg/m ²	皮下注d1,4,8,11	21日	
	エンドキサン	300mg/m ²	点滴静注d1,8		
	レナデックス	40mg/body	経口投与d1,2,4,5,8,9,11,12		
KRd	カイプロリス	27mg/m ²	点滴静注d1, 2, 8, 9, 15, 16	28日	
	レブラミド	25mg	経口d1~21		
	デキサメタゾン	40mg	点滴静注d1, 8, 15, 22		
Kd	カイプロリス	56mg/m ²	点滴静注d1, 2, 8, 9, 15, 16	28日	
	デキサメタゾン	20mg	点滴静注d1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23		
Kd(週1回投与)	カイプロリス	70mg/m ²	点滴静注d1, 8, 15	28日	
	デキサメタゾン	16.5mg	点滴静注d1, 8, 15		
DRD ダラツムマブ+レナリドミド +デキサメタゾン(ステロイド)	ダラザレックス	16mg/kg	点滴静注(別紙参照)		
	レブラミド	25mg	経口投与d1~21		
	ステロイド				
DBD ダラツムマブ+ホルテゾミブ +デキサメタゾン(ステロイド)	ダラザレックス	16mg/kg	点滴静注(別紙参照)		
	ベルケイド	1.3mg/m ²	皮下注d1,4,8,11		
	ステロイド				
骨髄異形成 症候群	ビダーザ 皮下注	ビダーザ	75mg/m ²	皮下注d1~7	28日
	ビダーザ 静注	ビダーザ	75mg/m ²	静注d1~7	28日
髄注	髄注	メソトレキセート	15mg/body	髄注	
		キロサイド	40mg/body		
		デキサート	1.65mg/body		
		蒸留水	4ml		